

為愛發聲

—愛滋不再來



宣講者：

杏陵醫學基金會 製作

你看到什麼？



圖片來源/攝影：大紀元/黃宗茂



影片欣賞：這是一部關於愛滋感染者的故事




黑仔



黑仔的
朋友



好心的
先生



家人

影片欣賞：黑暗之光

[BACK](#)

黑暗之光



黑仔得到什麼疾病？




你對愛滋病的
了解有多少？

卻成了他一生難以忘卻的回憶與痛苦

AIDS

後天 免疫 缺乏 症候群

由人類免疫缺乏病毒 (Human Immunodeficiency Virus, HIV)所引起的疾病，攻擊人體免疫系統，降低人體抵抗力，當細菌、病毒攻擊時人體無法反擊，進而導致死亡。



愛滋病小檔案

愛滋病毒主要生存於黏膜組織，經由體液的接觸與交換傳染給他人。病毒一旦離開人體數分鐘便死亡不具感染力。

目前愛滋病毒仍然沒有的疫苗，也沒有解藥

21世紀黑死病



為什麼黑仔會感染愛滋病毒呢？

BACK

為什麼黑仔的朋友要集資買性
交易慶祝黑仔成年呢？

分別出了一點錢，幫他買了一次性交易



你覺得發生性行為
就可代表長大、成年嗎？

一個真正成熟的人不會因一時的衝動而發生性行為，特別是與第一次見面、或不熟悉的對象。





你覺得親密性關係的發生

要有什麼條件？



避免陷入性誘惑，成為自己健康的主人



發生不安全的性行為，可能會有什麼後果呢？

不安全性行為的發生可能會導致性病的感染、懷孕、情感糾紛等問題。



近年來 愛滋病毒主要透過 不安全性行為感染

愛滋病感染者的精液或陰道分泌液中含有高濃度的病毒量，透過沒有保護措施的性行為，HIV病毒可經由陰道、陰莖、直腸或口部等黏膜組織進入人體。

網路交友不慎 13歲染愛滋



民眾預防勝於治療 / 圖片取自

(優活健康網記者張瓊之 / 綜合報導) 小寒是一名大學生，暑假時因一時好奇，參加於網路上發起的轟趴，後隨興和網友發生一夜情，開學時身體出現發熱、嗜睡、肌肉和關節疼痛、胃腸炎、淋巴結腫大、神經性頭痛、皮疹及腹瀉等愛滋病毒急性感染期初期常見症狀，到醫

衛生福利

進榜登上

示，103

者，其中


不安全



新興毒品型態多變

普遍，加上藥物濫用情況嚴重，提高年輕人性活躍度，增加感染風險。

這些行為都會增加發生
不安全性行為的風險



衛福部青年十大死因調查

近年來，愛滋感染者的年齡層下降。
愛滋病曾於101年進入青年的十大死因排名。

青少年預防愛滋病的方法

不發生性行為

進行任何性行為時

請全程正確地使用保險套
及水性潤滑液



凡士林

嬰兒油

安全Sing行為



使用五步驟

1. 撕



3. 套



5. 丟



2. 捏



4. 取



全程正確使用保險套

守護健康 遠離愛滋

性守ABC 愛滋防治有三套

A (Abstinence) → 節制 (拒絕性誘惑)

B (Be-faithful) → 忠實性伴侶

C (Condom) → 全程戴上保險套



臺中縣衛生局



行政院衛生署疾病管制局 關心您！




黑仔的乾爹為什麼感染愛滋病？



愛滋病的傳染途徑 除了性行為之外...

性行為



主要的傳染途徑

血液接觸感染



母子垂直感染



血液接觸感染

- ◆輸進或接觸被愛滋病毒污染的血液、血液製劑。
- ◆與感染愛滋病毒之靜脈藥癮者共用注射針具或稀釋液。
- ◆接受愛滋病毒感染之器官移植。



刺青



穿耳洞

刺青、穿耳洞要慎選有衛生把關、消毒、使用一次性針具的店家。

預防秘笈

平時避免不必要的輸血行為。

若處理傷口應戴手套避免接觸到血液，並請記得洗手。

母子垂直感染

感染愛滋病毒的母親在妊娠期、生產期或餵母乳時這三階段都可能將病毒傳染給嬰兒。因此，懷孕的女性皆要做產前檢查。若有感染愛滋病毒，媽媽及時的診斷與服藥，皆可有效降低傳染給嬰兒的機會。

預防嬰兒感染的方法

小孩出生後，立即接受預防性投藥，可將感染機率降到2%以下





最後，什麼原因讓黑仔的心境產生轉變，願意勇敢面對愛滋病呢？




尤其是他要陪伴乾爹一起對抗病魔



可怕的是愛滋病毒
不是愛滋感染者

這些行為都不會傳染愛滋病

- ◆輕吻
- ◆牽手、擁抱
- ◆蚊子叮咬
- ◆一起吃飯
- ◆一起上課
- ◆一起游泳



愛滋病可透過雞尾酒療法穩定控制

感染
HIV

產生抗體

死亡

越早發現、介入治療
可穩定控制病情

空窗期6-12週

潛伏期5至10年(未服藥)

愛滋感染者

患者

愛滋病感染者在健康的生活型態、規律的服藥下，可穩定控制病情。

魔術強森於1991年體檢發現感染愛滋病毒，經過多年穩定用藥控制，至今仍沒發病。

越早進行愛滋篩檢 越可穩定控制病情


感染的高風險族群

- ✓ 曾從事不安全性行為者
- ✓ 曾與人共用針具或稀釋液者
- ✓ 感染性病者

匿名篩檢

不需告知真實姓名
及提供健保卡
不用掛號
不須空腹
要事前預約

全國愛滋病諮詢專線
0800-888-995

A hand holding a red ribbon against a dark wood background. The ribbon is tied in a loop, symbolizing HIV/AIDS awareness.

12月1日 世界愛滋日

最初由紐約慈善藝術團體於1991年發起，紀念因感染愛滋病而死亡的朋友們。紅絲帶象徵著希望，代表大眾一同為愛滋防治努力。

許多的愛滋感染者生活在不安與痛苦之中，透過紅絲帶讓我們表達對愛滋感染者及其照顧者的關懷與支持。

世界愛滋日展現對愛滋感染者的關懷



你願意給我一個擁抱嗎？

影片授權：如果是你 IfiWereYou

SETN 三立新聞網

一個微小的動作 可以產生很大的影響

我是愛滋病感染者
你願意給我一個擁抱嗎？

愛滋去污名化

每個人的一个善意的舉動
能形成一股社會暖流
鼓勵感染者勇於走出黑暗
接受篩檢、獲得治療

零歧視

零成長

零死亡

關懷愛滋 我想說……

班級座號：

姓名：

如果我是路人，我想對感染者朋友說…

若是你是影片中的路人

想對感染者說什麼呢？

為愛先行 從我開始



為愛先行 從我做起

你有疑問 我解惑

◆ 青少年性教育諮詢專線

02-29104090

◆ 全國愛滋諮詢專線

0800-888-995





**WORLD
AIDS DAY**

1 DECEMBER

愛滋防治教育宣導教材

- 主辦機關 教育部國民及學前教育署
- 承辦機關 財團法人杏陵醫學基金會
- 協辦單位 台灣性教育學會
- 指導 晏涵文
- 主編 鄭其嘉
- 編輯 龍芝寧、鄭庭雨、馮嘉玉
- 中華民國106年11月

